

Secourir



La victime saigne abondamment

Résultat à atteindre

Arrêter le saignement

Action principale



Comprimer l'origine du saignement

- > Avec la paume de la main (protégée si possible).
Ou
- > Avec un pansement compressif.

Si inefficace ou insuffisant, appuyer avec la paume de la main sur le pansement compressif.

Cas particuliers

- > Saignement de nez : demander à la victime de s'asseoir, tête penchée en avant ; la faire moucher, puis lui demander de se comprimer les narines pendant 10 minutes.
- > Vomissements ou crachats sanglants : mettre la victime dans la position où elle se sent le mieux ; mettre au repos.

Vérifier, par observation, l'atteinte et la persistance du résultat attendu, jusqu'à la prise en charge de la victime par les secours spécialisés.

Action complémentaire

Pour éviter une aggravation de l'état de la victime

- > Faire allonger.
- > Surveiller l'efficacité de la technique utilisée.
- > Couvrir la victime sauf la plaie.
- > Réconforter.

Secourir



La victime se plaint d'une plaie qui ne saigne pas abondamment

Résultat à atteindre

Éviter toute aggravation de la plaie

Action principale



Pour une plaie grave

> Mettre la victime dans la position préconisée.

Ou

> Conditionner le segment sectionné.

Pour une plaie simple

> Nettoyer et protéger la plaie.

Vérifier, par observation, l'atteinte et la persistance du résultat attendu, jusqu'à la prise en charge de la victime par les secours spécialisés.

Action complémentaire

Pour éviter une aggravation de l'état de la victime

> S'assurer que la victime est à jour de sa vaccination antitétanique.